

Don sonrası aşırı sürgün gelişiminden kaçınmak gerekir. Sürgün gelişimini teşvik eden azotlu gübreleri daha az kullanmalıyız. Fosforlu ve Potasyumlu gübreler zamanında verilmeli ağaç direnci artırılmalıdır.

Toprakta su birikintisi olmadan, aşırı sulamadan kaçınarak damla sulama ile bitki dokularının olgunlaşması teşvik edilmelidir.

Don sonrasında ağaçlarda çatlak ve yara yerleri oluşmuş ise aşırı macunu ile kapatmalı enfeksiyon riskini en aza indirmeliyiz.

Don sonrası turuncgil bahçesinde yeni taze sürgünlerinde büyümesiyle hastalık ve zararlı yoğunluğunun artması muhtemeldir. Uygun ilaçlama programları ile ruhsatlı ilaçlar kullanılarak mücadele edilmelidir.



ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0 (324) 518 00 52

Faks : 0 (324) 518 00 80

alata@tarimorman.gov.tr

© 2025 TAGEM

T.C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü



MERSİN
2025

Turunçgil Bahçelerinde Don Zararı

Sonrası Neler Yapılmalıdır?

Don olayını sonrası yapılacak ilk faaliyet budama işlemidir. Fakat budama işlemi için kesinlikle acele edilmemelidir.

Zararın tam olarak ortaya çıkması birkaç hafta sürebildiği gibi, değişen iklim şartlarına bağlı olarak 30-40 gün sürede ortaya çıkması da muhtemeldir. Bu süreçte ilkbahar sürgünlerinin gelişip olgunlaşması önem arz etmektedir.



Don zararı sonrası zarar tespiti ve değerlendirme çalışmaları uzman ekipler tarafından kayıt altına alındıktan sonra ağaç dalları, gövdesi ve yaprakları dikkatlice incelenmelidir.

Dallar üzerinde çatlaklar, renk değişiklikleri, kurumalar ve yumuşama durumu, gövde üzerinde kabukta ayrılmalara ve çatlak durumu, yapraklar üzerinde sararma, kahverengileşme, kuruma durumu dikkatlice tespit edilir.

Aşırı budamadan kaçınılmalı, hafif bir taç içi dal seyreltmesi yaparak dikine büyüyen ve zayıf düşmüş dallar uzaklaştırılmalıdır.



Bu işlemler sonrası canlı doku hedef nokta olmalıdır. Kurumuş, çatlamış kısımlar canlı ve

yeşil dokunun bulunduğu noktaya kadar budanmalı ve araziden uzaklaştırılmalıdır.

Budama işlemi sonrası bordo bulamacı /fungisit uygulaması mutlaka yapılmalıdır.

Soğuktan hasar görmüş ağaçların yeniden güçlenmesi için dengeli bir gübreleme programı yapmak son derece önemlidir.

İlkbaharda gözler kabarmadan 15-20 gün öncesinde toprak analizi sonucuna göre gübreleme programı yapılması gerekmektedir.

